

# PAN-ENTERIL®

## Suspensión antidiarreica Formulación extemporánea para administración oral

Uso en medicina veterinaria  
Venta bajo receta  
Industria Argentina

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Conservar entre 15° y 30°C.  
Uso en Caninos y Felinos.

**Fórmula:** Loperamida Hidrocloruro, 0,045 g; Subsalicilato de bismuto, 4,5 g; Caolín, 91,376 g; Pectina cítrica, 2,010 g; Furazolidona, 1,305 g; Polivinilpirrolidona c.s.p., 100 g.

**Acciones farmacológicas:** Modulador de la motilidad intestinal (estimulantes de la segmentación rítmica). Antisecretorio intestinal. Adsorbente luminal de gases, productos de degradación y fermentación, toxinas, enterotoxinas, bacterias y virus. Protector y procoagulante mucoso intestinal. Antiprotozoario. Antibacteriano.

**Acción terapéutica:** Antidiarreico.

**Indicaciones:** Tratamiento sintomático coadyuvante y específico de enteritis agudas y crónicas de diversas etiologías. Diarreas nutricionales asociadas y cambios dietéticos, sobrecarga alimenticia, toxoinfecciones alimentarias (consumo de desperdicios). Diarreas bacterianas a *Campilobacter jejuni*, *E. coli*, *Clostridium spp.*, *Salmonella spp.*, y/o *Estreptococos*, primarias o secundarias a trastornos fermentativos. Diarreas virales a parvovirus canino y felino, rotavirus y coronavirus canino y felino. Síndrome de gastroenteritis hemorrágica. Diarreas protozoarias a *Cystoisospora spp.*, *Giardia spp.*, *Eimeria*, *Histomonas*.

**Posología:** Animales menores de 30 días de edad: 0,5 mL/Kg. (1 cucharada tamaño postre cada 10 Kg. P.V.) cada 6 horas. Cachorros mayores, animales jóvenes y adultos: 0,75 mL/Kg. (1 ½ cucharadas tamaño postre cada 10 Kg. P.V.) cada 6 horas.

**Duración del tratamiento:** En caso de diarreas protozoarias, se recomienda medicar durante 7 días consecutivos, realizar estudios coproparasitológicos y repetir el mismo esquema de ser necesario.

En caso de diarreas no protozoarias, continuar con la medicación hasta 24 horas posteriores a la remisión del cuadro clínico.

**Efectos colaterales:** Ocasionalmente constipación y/o timpanismo. Discromía fecal.

**Precauciones de uso:** Insuficiencia renal, insuficiencia hepática crónica. No administrar en animales que presenten cuadros similares a íleos intestinales.

**Contraindicaciones:** Preñez. Obstrucción intestinal.

**Advertencia:** Pan-Enteril puede modificar a negro al color de las deposiciones.

**SE DEBE AGREGAR AGUA CORRIENTE HASTA EL HOMBRO DEL FRASCO (150 ML), TAPAR Y AGITAR MUY ENÉRGICAMENTE ANTES DE CADA ADMINISTRACIÓN.**

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.

Centro Toxicológico Hospital de Niños Dr. Gutiérrez: 4962-6666.



SENASA Cert. N° 92.447

Elaborado y fraccionado en LabCecil S.R.L. (Est. elab. N°: 8473) Santa Rosalía 2015, San Andrés, Pcia. Bs. As.

Director Técnico: Dr. Luis Jáuregui - Veterinario M.N. N° 6537

**Bolivia:** Importado por: Importadora Representaciones I.I.P. Calle Fortín Vanguardia N° 718, Cochabamba, Bolivia.

Reg. SENASAG PUV-F N° 004463/11. CR-EMP N° 03-0008/06

**Perú:** Importado y distribuido por Mederi EIRL, Av. Caminos del Inca 1434, Surco, Lima. Reg. Perú. N° SENASA F.04.321.0029

**TRITON**  
vet

**LABORATORIO TRITÓN VET S.R.L.**  
Lavalle 2063, Gral. San Martín,  
Pcia. de Buenos Aires (BI650ATQ)

 / Tritón Vet