CIPROFLOXACINA TRITON® / 200

Quimioterapico de amplio espectro, en comprimidos ranurados.

Uso en Medicina Veterinaria
Venta bajo receta
Industria Argentina
Uso en caninos y felinos.
No congelar, ni refrigerar.

No almacenar por encima de los 30°C.
Conservar al abrigo de la luz en un lugar higiénico.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Fórmula/Composición Garantizada: Cada comprimido contiene:

Ciprofloxacina monohidrato clorhidrato	200 mg
Agentes de formulación c.s.p.	500 mg

Indicaciones: Quimioterápico de amplio espectro indicado para toda infección producida por gérmenes sensibles a la ciprofloxacina en el tracto gastrointestinal, génito-urinario, respiratorio, piel y tegumentos, aparato músculo-esquelético o infecciones sistémicas.

Propiedades farmacológicas: La ciprofloxacina es una fluoroquinolona con un espectro antibacteriano extendido y potencia mejorada. Posee habilidad de alcanzar concentraciones terapéuticas en suero, tejidos y orina luego de la administración oral. Se trata de un quimioterápico bactericida absoluto que no requiere crecimiento de la población bacteriana para ejercer su acción. Tienen una acción bactericida rápida, que es dosis dependiente (en relación con la concentración del antibiótico). Las quinolonas interfieren en la replicación del ADN al bloquear o inhibir las enzimas topoisomerasa II y topoisomerasa IV, enzimas esenciales para la topología del ADN. La formulación oral ha demostrado ser clínicamente efectiva en un amplio rango de infecciones urinarias, respiratorias y gastrointestinales, hallándose incluso concentraciones de ciprofloxacina superiores a las concentraciones inhibitorias mínimas (CIM 90%) de varios microorganismos.

Propiedades farmacocinéticas: La ciprofloxacina presenta una farmacocinética no linear luego de la administración oral demostrada por el ajuste de los datos AUC vs dosis a una ecuación cuadrática. La tasa de absorción es variable, pero se estima que luego de la administración oral de ciprofloxacina se absorbe un 40% en perros y un 33% en gatos. El volumen de distribución es muy amplio, incluso mayor al volumen de agua corporal, lo que supone concentraciones intracelulares muy altas. Las concentraciones de ciprofloxacina en macrófagos y neutrófilos son mayores a las concentraciones séricas. La unión a proteínas plasmáticas es baja, del orden del 18,5 al 44%, principalmente a albúminas. La tasa de eliminación a dosis de 10 y 20 mg/Kg. fue aproximadamente 0.0024/min. En general, la vía de eliminación es renal, básicamente por secreción tubular, aunque existe un porcentaje menor de pérdida por filtrado glomerular.

Vía de administración: Vía oral.

Dosificación de los principios activos en caninos y felinos:
- Para infecciones urinarias: 5-8mg/kg cada 12 hs por 7 a 14 días.
- Para infecciones tegumentarias: 7-11 mg/Kg cada 12 hs por 7 a 14 días.
- Para infecciones óseas, sistémicas o patógenos resistentes: 10-15 mg/Kg cada 12 hs por 7 a 14 días.

FRENTE

Efectos colaterales: Ciprofloxacina: Los efectos colaterales son raros, pero ocasionalmente puede presentarse vómito y/o diarrea.

Precauciones de Uso: Ciprofloxacina: La ciprofloxacina puede causar erosión de cartílago de crecimiento en animales jóvenes. Por ello, no está recomendado su uso en perras lactantes ni en animales de razas chicas y medianas entre los 2 a 8 meses de edad; en razas grandes, antes del año de vida y en razas gigantes, se sugiere esperar hasta los 18 meses. La absorción del alimento, sucralfato, compuestos que contengan cationes di y trivalentes (calcio, magnesio), y antiácidos puede disminuir la absorción de la ciprofloxacina, por lo que se recomienda administrar lejos de las comidas y otras medicaciones. La ciprofloxacina puede incrementar los niveles plasmáticos de teofilina, cuando se administran en forma simultánea. En pacientes con enfermedad renal, la dosis debería ser disminuida. Las fluoroquinolonas pueden exacerbar el potencial nefrotóxico de la ciclosporina.
El uso de este producto sin un diagnóstico correcto, puede generar resistencia antimicrobiana. Se deberá respetarla dosis, intervalos y duración del tratamiento.

Contraindicaciones: La ciprofloxacina no debe ser administrada en perras preñadas por su potencial teratogénico.

Toxicidad: El producto carece de toxicidad a las dosis recomendadas. En gatos, dosis muy elevadas de ciprofloxacina puede provocar vómitos y espasmos clónicos de los músculos; mientras que en perros tratados con dosis elevadas durante 8 a 12 meses pueden presentar cataratas subcapsular e inflamación asociada, así como toxicidad renal manifestada como cristaluria y depósitos de cristales en túbulos renales.

El uso de este producto sin un diagnóstico correcto, puede generar resistencia antimicrobiana. Se deberá respetarla dosis, intervalos y duración del tratamiento.
Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

Presentaciones: Estuches conteniendo 2 ó 10 blisters de 8 comprimidos cada uno.

SENASA Certificado N° 01-300

Elaborado y fraccionado en LabCecil S.R.L. (Est. Elab. N°:8473); para Laboratorio Triton Vet S.R.L.

Director Técnico: Dr. Luis Jáuregui - Veterinario M.N. N° 6537

Bolivia: Importado por: Importadora Representaciones I.I.P. Reg. CR-EMP N° 03-0008/06 Bolivia SENASAG Reg. PUV-F - N° 001734/07.
Costa Rica: Registro N° MV-7314.
Ecuador: Importado y distribuido por FARCOVET S.A., Km 23 Vía Daule, Manzana 30, solar 01, Guayaquil-Ecuador. Reg. Ecuador. Registro N° 2C1-11681-AGROCALIDAD.
Guatemala: Registro N° MV-119.
Nicaragua: Distribuidora Veterinaria S.A (DIVETSA) Bello horizonte, rotonda 150 mts al sur Managua, Nicaragua. Registro N° MV-15688.
Panamá: Registro N° MV-5942.
Perú: Importado y distribuido por Mederi EIRL Ca. Carlos Tenaud 196 Urb. Los Rosales Santiago de Surco - Lima - Perú. Reg. Perú N° SENASA F.21.21.I.0031.
República Dominicana: Registro N° 7070.

Prosp.34-2025-2

LABORATORIO TRITON VET S.R.L.
Lavalle 2063, (B1650 ATQ) Gral. San Martín, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
www.triton-vet.com / info@triton-vet.com / Triton Vet / @TritonvetArg

DORSO

ATELIER

Producto: Prospecto Ciprofloxacina Triton 200
Código: Prosp.34-2025-2
Color: Negro
Medidas: 90 x 150 mm
Escala: 1:1
Fecha: 17/07/26