DOXICICLINA TRITON®

Antibiótico para caninos y felinos

Uso en Medicina Veterinaria
Venta con receta veterinaria
Industria Argentina
Uso en Perros y Gatos.

No almacenar por encima de los 30°C. No congelar.
Conservar al abrigo de la luz en un lugar higiénico.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Fórmula/Composición Garantizada:
Comprimidos para 5 kg de peso contiene:
Doxiciclina ..... 50 mg
Excipientes c.s.p. ..... 150 mg

Comprimidos para 15 kg de peso contiene:
Doxiciclina ..... 150 mg
Excipientes c.s.p. ..... 450 mg

Presentaciones:
Estuches conteniendo 50 comprimidos, con su prospecto correspondiente, tanto para las presentaciones de 50 mg o de 150 mg de doxiciclina.

Indicaciones de uso:
Está indicado en caninos y felinos para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas: *Ehrlichia spp., Haemobartonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium spp., Fusobacterium spp., Leptospira spp., Micoplasma spp., Clamidia spp.*

Vía de administración y dosis:
La vía de administración es exclusivamente oral.

La dosis de doxiciclina es de 5 mg/kg cada 12 horas ó de 10 mg/kg cada 24 horas.
1 comprimido cada 5 kg (**Doxiciclina Triton 50 mg**) ó 1 comprimido cada 15 kg (**Doxiciclina Triton 150 mg**)
La duración del tratamiento queda sujeta a criterio del Profesional veterinario, según su diagnóstico:
- En caso de ehrlichiosis, leptospirosis o bartonelosis: suministrar al menos 30 días
- En caso de infecciones bacterianas susceptibles: la duración de tratamiento es variable, pero se recomienda suministrar el producto hasta 14 días.

Contraindicaciones y limitaciones de uso:
Dada la amplitud del espectro, la acción se desarrolla no sólo contra gérmenes patógenos sino también contra los que constituyen la flora normal del intestino.
El grado de disbacteriosis depende de la dosis, de la duración del tratamiento, de la composición de la flora intestinal y de su sensibilidad. Después de disminuir el número de gérmenes sensibles, predominan algunos resistentes como *E. coli, Proteus, Pseudomonas*, hongos y la motilidad intestinal aumenta.

FRENTE

Restricción de uso:
No administrar a hembras preñadas ni lactantes, tampoco debe administrar en animales que sigan tratamiento con fenitoína o barbitúricos, No administrar junto con antiácidos orales.

Precauciones que deben adoptarse antes, durante o después de su administración.

Se debe administrar con el alimento. Ante el aumento de enzimas hepáticas, debe emplearse con cuidado en casos de disfunción hepática.
El uso de este producto sin un diagnóstico correcto, puede generar resistencia antimicrobiana.
Se deberá respetar la dosis, intervalos y duración del tratamiento.

Efectos colaterales:
Los efectos colaterales de mayor frecuencia son náuseas y vómitos.
También es posible el aumento de las enzimas hepáticas. La administración oral en gatos ha sido implicada como causa de estenosis esofágica.

Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo con la legislación local vigente.

El período de validez es de 2 años, desde su fecha de elaboración.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160
Centro Toxicológico Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 4962-6666

SENASA Ext. Certificado N° 25-088

Elaborado y fraccionado en LabCecil S.R.L. (Estab. elaborador N°: 8473) Santa Rosalía 2015, San Andrés, Pcia. de Buenos Aires, Argentina; para Laboratorio Triton Vet S.R.L.

Director Técnico: Dr. Luis Jáuregui - Veterinario M.N. N° 6537

Prosp.7778-2026-1

TRITON **LABORATORIO TRITON VET S.R.L.**

Lavalle 2063, (B1650 ATQ) Gral. San Martín, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
www.triton-vet.com / info@triton-vet.com / Triton Vet / @TritonvetArg

DORSO

ATELIER

Producto: Prospecto Doxiciclina Triton
Código: Prosp.7778-2026-1
Color: Negro
Medidas: 90 x 150 mm
Escala: 1:1
Fecha: 11/02/26

Se corrigió la ubicación de textos de SENASA