# PROPANTELINA TRITON®

**Antiespasmódico, para vías urogenitales y/o digestivas, en comprimidos ranurados.**

Uso en Medicina Veterinaria
Venta bajo receta
Industria Argentina
Uso en caninos y felinos.
No congelar, ni refrigerar.

No almacenar por encima de los 30°C.
Conservar al abrigo de la luz en un lugar higiénico.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**Fórmula/Composición Garantizada:** Cada comprimido contienen:
Bromuro de propantelina ..... 5 mg
Excipientes c.s.p. ..... 150 mg

**Indicaciones:** Antiespasmódico del tracto urinario en patologías tales como: cólico renal, urolitiasis, Enfermedad del Tracto Urinario Inferior Felino, cistitis, espasticidad, inestabilidad e incontenencia del músculo detrusor vesical, vaciamiento vesical inapropiado. anormalidades de la micturición.
Antiespasmódico del tracto digestivo, en patologías tales como: úlceras gastro-duodenales, estados espasmódicos del intestino (Colon irritable, colitis, diarrea), constipación espasmódica, colecistitis, disquinesias biliares.
El Bromuro de Propantelina es una droga parasimpaticolítica de acción similar a la atropina, con capacidad de inhibir los movimientos peristálticos y reducir la hiperreflexia del detrusor vesical (por dolor o irritación). Esta droga interactúa con los receptores muscarínicos de las células efectoras, y por antagonismo competitivo previene la fijación de la acetilcolina sobre las células del músculo liso, cardíaco y glándulas. Este efecto bloqueante muscarínico sería el responsable de su efecto antiespasmódico sobre el músculo liso, especialmente el gastrointestinal y urinario.

**Vía de administración:** Vía oral.

**Dosificación:** 1 comprimido cada 10 kg de peso, cada 12 horas, durante 7 a 14 días o según criterio profesional.

*Dosificación del principio activo:* Bromuro de Propantelina: 0.5 mg/kg/12 hs.

**Efectos colaterales:** Bromuro de Propantelina: Debido a su actividad antimuscarínica, los efectos colaterales más frecuentes incluyen taquicardia, debilidad, vómito, midriasis, sequedad de membranas mucosas, disminución de la velocidad de evacuación gástrica y constipación. En felinos es relativamente frecuente observar hipersalivación.

**Precauciones de Uso:** Bromuro de Propantelina: Su administración puede mejorar la actividad de drogas simpaticomiméticas, diuréticos a base de tiazidas y nitrofurantoína. El uso de antihistamínicos, procainamida, meperidina, benzodiazepinas y fenotiazina puede aumentar la actividad de la propantelina. La propantelina retrasa la absorción de la ranitidina y disminuye la absorción de cimetidina o. No debe usarse mas de 3 días en el paciente que vomita.

**Contraindicaciones:** Los antimuscarínicos están contraindicados en casos de glaucoma, obstrucción pilórica o intestinal, íleo intestinal o parálisis vesical.

**Toxicidad:** El producto carece de toxicidad a las dosis recomendadas. Los signos de intoxicación por propantelina incluyen excitación, retención urinaria, hipotensión, fallo respiratorio, parálisis y coma. Todos los signos asociados con sobredosis remiten luego de la suspensión medicamentosa, no registrándose secuelas clínicas.

Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.
Centro Toxicológico Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 4962-6666.

**Presentaciones:**
Estuches conteniendo 16 y 80 comprimidos ranurados.

**REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS RECOMENDADAS:**


*Medicina Interna de Animales Pequeños, Editorial Intermedica, 1997. R. Nelson, C Couto, vol III, pp 682, 715, 718.*

*Enfermedades del aparato urinario de perros y gatos. Editorial Intermedica, 1996. Ling, GV. 19, 132, 168, 180, 183, 200.*

*Terapéutica Veterinaria de Pequeños Animales XII. Editorial McGraw Hill Interamericana, 1997. Kirk, RW & Bonagura, JD, página: 1559.*

*Levin, RM;Wein,AJ; 1982. Direct measurement of the anticholinergic activity of a series of pharmacological compounds on the canine and rabbit urinary bladder. J. Urol., 128 (2): 396-8.*

*Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica. Séptima edición, 1987. Editorial Médica Panamericana. A. Goodman Gilman, L Goodman. Páginas 169-75.*

*Micturition disorders. Continuing education, SAM VM552. http://www.vetmed.wsu.edu/boeing/small_animal_medicine/micturit.htm*


SENASA Certificado N° 02-284

Elaborado por LabCecil S.R.L (Est. Elab. N°:8473); para Laboratorio Triton Vet S.R.L.
Director Técnico: Dr. Luis Jáuregui - Veterinario M.N. N° 6537

**Bolivia:** Importado por: Importadora Representaciones I.I.P. Reg. CR-EMP N° 03-0008/06 Bolivia SENASAG. Reg. PUV-F - N° 002464/08.
**Ecuador:** Importado y distribuido por FARCOVET S.A., Km 23 Vía Daule, Manzana 30, solar 01, Guayaquil-Ecuador. Reg. Ecuador N° 8A3-12766-AGROCALIDAD.
**Guatemala:** Registro N° MV-2249.
**Honduras:** Registro N° 07571.
**Nicaragua:** Distribuidora Veterinaria S.A (DIVETSA) Bello horizonte, rotonda 150 mts al sur Managua, Nicaragua. Registro N° MV-15689.
**Panamá:** Registro N° MV-6311.
**Paraguay:** Hogar Animal. Hab. de Senacsa N° 1704.
Reg. Técnico Elvio Figueredo. Reg. Prof. N° 1663. Reg Senacsa N° 26753.
**Perú:** Importado y distribuido por Mederi EIRL - Ca. Carlos Tenaud 196 Urb. Los Rosales - Santiago de Surco - Lima - Perú. Reg. Perú N° SENASA F.50.21.I.0007.
**República Dominicana:** Registro N° 6654.
**Uruguay:** Registrante Tradeinvetuy SAS, Alejandro Chucarro 1168/402, Montevideo, Uruguay. M.G.A.P. Reg. N° 2017 A-00445. D.T. Dr. Julio Nuñez Gabito. TE: + 59899662523

Prosp.40-2026-1


**LABORATORIO TRITON VET S.R.L.**
Lavalle 2063, (B1650 ATQ) Gral. San Martin, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
www.triton-vet.com / info@triton-vet.com / Triton Vet / @TritonvetArg


*FRENTE*

*DORSO*

ATELIER

Producto: Prospecto Propantelina Triton
Código: Prosp.40-2026-1
Color: Negro
Medidas: 90 x 150 mm
Escala: 1:1
Fecha: 17/07/26

Se actualizaron los datos de Uruguay
Se sacó dirección de Lab.Cecil.
Se agregó la dirección a Nicaragua.