SPECTRYL® COMPRIMIDOS

Ciprofloxacina más Metronidazol

Asociación Antibiótica para el Tratamiento de Gérmenes Aeróbicos y Anaeróbicos, en comprimidos ranurados

Uso en Medicina Veterinaria.
Venta bajo receta.
Industria Argentina.
Uso en caninos y felinos (gatos).
No congelar, ni refrigerar.

No almacenar por encima de los 30°C.
Conservar al abrigo de la luz en un lugar higiénico.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Fórmula/Composición Garantizada:

Cada comprimido de **Spectryl 10** contiene:		Cada comprimido de **Spectryl 20** contiene:	
Ciprofloxacina	100 mg	Ciprofloxacina	200 mg
Metronidazol	250 mg	Metronidazol	500 mg
Excipientes c.s.p.	700 mg	Excipientes c.s.p.	1.400 mg

Indicaciones: Spectryl está indicado para el tratamiento de todas aquellas infecciones producidas por agentes microbiológicos susceptibles a la ciprofloxacina y/o metronidazol.
Entre las principales indicaciones figuran:

- Tratamiento de infecciones de tejidos blandos, como ser abscesos, heridas traumáticas, heridas por mordeduras, heridas tetanogénicas.
- Infecciones del tracto gastrointestinal, con compromiso de flora aeróbica y anaeróbica, como ser diarreas infecciosas producidas por bacterias del género *Clostridium, Salmonella, E. coli, Campylobacter*, y otras.
- Otra indicación posible, es el tratamiento de infecciones bucales, como ser estomatitis, gingivitis, glositis.
- Se indica el empleo de este producto para el control microbiológico pre- y post-quirúrgico, sobre todo de cirugías traumatológicas, del tracto digestivo (abscesos abdominales, peritonitis) y de emergencias.
- La acción conjunta de la ciprofloxacina con metronidazol puede ser de utilidad terapéutica en el tratamiento de la helicobacteriosis felina, con su signo asociado de gastritis crónica.
- Del mismo modo, la colitis ulcerativa es una indicación precisa para el empleo de estas dos drogas, incluso el efecto inmunomodulador del metronidazol permite indicarlo en afecciones inflamatorias intestinales (inflammatory bowel disease).
- Se ha descripto la utilidad del metronidazol en el manejo de la hepatitis crónica, especialmente cuando ocurre encefalopatía hepática bacteriana.

Espectro antimicrobiano: *Pseudomona aeruginosa, Staphilococcus coagulasa positivos y negativos, Staphilococcus beta-hemoliticos, Staphilococcus intermedius, Staphilococcus aureus, Pausterella multocida, Moraxella spp, Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp, Klebsiella spp, Campylobacter spp, Proteus spp, Bordetella bronchiseptica, Mycoplasma spp, Arcanobacterium pyogenes, Yersinia, Enterobacter, Clostridium perfringens, Clostridium difficile, Giardia, Entamoeba, Tricomonas, Balantidium, Bacteroides, Porphyromona gingivalis, Porph. salivosa, Porph. circumdentaria.*

Vía de administración: Oral.

Dosificación: Spectryl 10: 1 comprimido cada 10 kg. de peso, cada 12 hs. durante 7 a 21 días o según criterio profesional.
Spectryl 20: 1 comprimido cada 20 kg. de peso, cada 12 hs. durante 7 a 21 días o según criterio profesional.

Dosificación de los principios activos: Ciprofloxacina: 10 mg/Kg./12 hs.
Metronidazol: 25 mg/Kg./12 hs.

Efectos colaterales: Para el caso de metronidazol, los efectos colaterales más usuales se relacionan con su mal sabor, produciendo malestar gastrointestinal. Puede también hallarse frecuentemente otros signos como excesiva salivación, regurgitación, vómito y disminución de apetito. Efectos más raros son diarrea, depresión, letargia, falla hepática, hematuria y bajo recuento de blancos.
El metronidazol es mejor tolerado si es dado con las comidas. En el caso de ciprofloxacina, los efectos colaterales son raros, pero pueden presentarse vómitos y diarrea. La ciprofloxacina puede causar erosión de cartílago de crecimiento e infosura permanente en animales jóvenes. Por ello, no está recomendado su uso en perras lactantes ni en animales de razas chicas y medianas entre los 2 a 8 meses de edad; en razas grandes, antes del año de vida y en razas gigantes, se sugiere esperar hasta los 18 meses.

El uso de este producto sin un diagnóstico correcto, puede generar resistencia antimicrobiana. Se deberá respetar la dosis, intervalos y duración del tratamiento.

Precauciones de uso: La absorción del alimento, sucralfato, compuestos que contengan cationes di y trivalentes (Ca^{2+}, Mg^{2+}), y antiácidos puede disminuir la absorción de la ciprofloxacina, por lo que se recomienda administrar lejos de las comidas y otras medicaciones. La ciprofloxacina puede incrementar los niveles plasmáticos de teofilina, cuando se administran en forma simultánea.
En pacientes con enfermedad renal, la dosis debería ser disminuida. Las fluoroquinolonas pueden exacerbar el potencial nefrotóxico de la ciclosporina. El empleo de metronidazol puede elevar el tiempo de protrombina en animales anticoagulados con cumarínicos o warfarina. La cimetidina puede alterar el metabolismo hepático del metronidazol, y su dosis debe ser reducida.
El fenobarbital y la fenitoína pueden incrementar el metabolismo de metronidazol.

Contraindicaciones: Spectryl no debe ser administrado en perras preñadas ni lactantes por su potencial teratogénico, mutagénico y carcinogénico.

Toxicidad: El producto carece de toxicidad a las dosis recomendadas. En gatos, dosis muy elevadas de ciprofloxacina pueden desarrollar vómitos y espasmos clónicos de los músculos; mientras que en perros tratados con dosis elevadas durante 8 a 12 meses pueden presentar cataratas subcapsular e inflamación asociada, así como toxicidad renal manifestada como cristaluria y depósitos de cristales en túbulos renales. Los signos de intoxicación por metronidazol ocurren por sobredosificación o por terapias prolongadas a altas dosis (dosis orales mayores a 66 mg/Kg), entre estos signos se incluyen depresión, ataxia, desorientación, tremores, rigidez, y convulsiones. Todos los signos asociados con sobredosis comienzan alrededor de 7 a 12 días de inicio del tratamiento y remiten luego de la suspensión medicamentosa (hasta 2 semanas post-interrupción), no registrándose secuelas clínicas. La DL_{50} en perros para el metronidazol es de 4,5 g/kg.

Presentaciones: **Spectryl 10** envases conteniendo 20 y 100 comprimidos.
Spectryl 20 envases conteniendo 10 y 50 comprimidos.

Los envases utilizados deben ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

SENASA Certificado N° 06-339

Elaborado y fraccionado en LabCecil S.R.L. (Est. Elab. N°:8473); para Laboratorio Triton Vet S.R.L.

Director Técnico: Dr. Luis Jáuregui - Veterinario M.N. N° 6537

Bolivia: IMPORTADORA REPRESENTACIONES LLP. REG.CR-EMP N° 03-0008/06 BOLIVIA SENASAG
Reg. PUV - N° 006240/14 (Spectryl 10) - Reg. PUV - N° 001985/08 (Spectryl 20).
Costa Rica: Registro N° MAG N° MV-7723. Este producto puede producir resistencia antimicrobiana.
Ecuador: Importado y distribuido por FARCOVET S.A., Km 23 Vía Daule, Manzana 30, solar 01, Guayaquil-Ecuador.
Reg. Ecuador N° 2C1-12257-AGROCALIDAD.
Guatemala: Registro N° MV-1869 (Spectryl 10) - Registro N° MV-1810 (Spectryl 20).
Honduras: Registro N° MV-07488.
Nicaragua: Distribuidora Veterinaria S.A (DIVETSA) Bello horizonte, rotonda 150 mts al sur Managua, Nicaragua.
Registro N° MV-15687 (Spectryl 10) - Registro N° MV-15686 (Spectryl 20).
Panamá: Registro N° MV-5943 (Spectryl 10) - Registro N° MV-5944 (Spectryl 20).
Paraguay: Hogar Animal. Hab. de Senacsa N° 1704. Reg. Técnico Elvio Figueredo. Reg. Prof. N° 1663.
Reg Senacsa N° 26702.
Perú: Importado y distribuido por Mederi EIRL Ca. Carlos Tenaud 196 Urb. Los Rosales - Santiago de Surco - Lima - Perú.
Reg. Perú N° SENASA F.03.31.1286 (Spectryl 10) - SENASA F.03.21.1609 (Spectryl 20)
Republica Dominicana: Registro N° 7072 (Spectryl 10) - 7073 (Spectryl 20)
Uruguay: Registrante Tradeinvetuy SAS, Alejandro Chucarro 1168/402, Montevideo, Uruguay.
M.G.A.P. Reg. N° A-5189 (Spectryl 20). D.T. Dr. Julio Nuñez Gabito. TE: + 59899662523. No conservar por encima de 30°C.

Prosp. 10-2026-1

TRITON **LABORATORIO TRITON VET S.R.L.**

Lavalle 2063, (B1650 ATQ) Gral. San Martín, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
www.triton-vet.com / info@triton-vet.com / Triton Vet / @TritonvetArg

FRENTE

DORSO

ATELIER

Producto:	Prospecto Spectryl
Código:	Prosp.10-2026-1
Color:	Negro
Medidas:	90 x 150 mm
Escala:	1:1
Fecha:	09/09/26

Se actualizaron los datos de Uruguay
Se actualizaron los datos de Bolivia
Se sacó la frase del Hospital Gutierrez
Se sacó dirección de Lab.Cecil
Se agregó la dirección a Nicaragua.
Se modificó texto “Espectro antimicrobiano”